



نام دارو:
نالترکسون

اشکال دارویی :
کپسول های ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی

دسته دارویی :
آنتاگونیست اوبیویدی

موارد مصرف :
نالترکسون به عنوان یک داروی کمکی در درمان ترک اعتیاد به کار می رود. قبل از شروع درمان با نالترکسون باید سم زدایی در فرد بیمار انجام گیرد.

مقدار مصرف :
• دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف آن به مقدار و دفعات بیشتر و به مدت طولانی تر خودداری نمایید.
• این دارو باید حداقل ۱۰-۷ روز پس از قطع وابستگی به مواد مخدر مصرف شود.
• توصیه می شود که درمان با مقادیر کم شروع شده و برای افزایش تحمل بیمار مقدار مصرف کم کم افزایش یابد.
• دوز معمولی این دارو ۲۵ میلی گرم در روز می باشد. در صورتیکه هیچ گونه علائم محرومیت ایجاد نشد میتوان ۱ ساعت بعد یک دوز ۲۵ میلی گرمی دیگر تجویز کرد.
• دوز نگهدارنده این دارو ۵۰ میلی گرم در هر ۲۴ ساعت می باشد.
• مقدار مصرف این دارو در بیماران کمتر از ۱۸ سال تعیین نشده است.
• در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، در صورتیکه دارو را با دوز روزی یک کپسول مصرف می نمایید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید و اگر تا روز بعد به خاطر نیاوردید دوز بعدی را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف :
حساسیت نسبت به این دارو
هپاتیت حاد یا نارسایی کبدی

موارد هشدار و احتیاط :
اختلالات کلیوی
اختلالات کبدی

عوارض جانبی :
اختلال در خواب، اضطراب، کرامپهای شکمی، ضعف، تهوع، سرگیجه، انزال دیررس و سمیت کبدی

تداخلات دارویی :
تیوریدازین

مصرف در بارداری و شیردهی :
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :
دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .