

**لیدوکائین ۱٪**

محلول اسپری موضعی ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

می‌رود. برحسب موضع، بی حسی معمولاً در عرض ۵ - ۱ دقیقه ایجاد شده و به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه باقی خواهد ماند.

- این دارو از سطح زخم و مخاط تنفسی سریعاً جذب می‌شود.
- بی حسی کننده های موضعی باید در حداقل مقدار نیاز مصرف شوند.
- در افراد مسن و کودکان دوز برحسب سن و شرایط فیزیکی آنها تنظیم میگردد.
- هر یاف حاوی ۱۰ میلی گرم لیدوکائین است.
- جهت بی حسی در بزرگسالان کمتر از ۲۰ یاف مصرف شود.
- جهت بی حسی در دندانپزشکی ۵-۱۵ یاف بر روی مخاط نظر استفاده گردد.

**عوارض جانبی:**

عوارض جانبی سیستمیک این دارو بسیار نادر می‌باشد. در صورت مصرف بیش از حد و یا حساسیت به دارو ممکن است عوارض زیر ایجاد شود:

- تحریک پذیری، افسردگی، عصبانیت، گیجی، قرمزی چشم، لرزش، کاهش فشارخون و برادیکاردی.
- عوارض مصرف بیش از حد دارو شامل: تحریک پذیری، گیجی، بی‌هوشی و حملات تنفسی می‌باشد.
- در استفاده دهانی این دارو، در صورت تماس دارو با مخاط حلق ممکن است مشکلات بلع و خطر آسپیراسیون اجسام خارجی ایجاد گردد.
- در بی حسی مخاط دهان، این دارو ترشحات موکوسی را افزایش می‌دهد.

**مسمومیت:**

در صورت مصرف اتفاقی دارو بصورت خوراکی، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

**شرایط نگهداری:**

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- بدلیل قابل اشتعال بودن دارو، در مجاورت شعله و حرارت قرار ندهید.

**بسته بندی:**

- این دارو به شکل محلول ۱۰٪ در شیشه های بی رنگ ۵۰ میلی لیتری (حاوی ۵۰۰ یاف) و ۱۰۰ میلی لیتری (حاوی ۱۰۰۰ یاف) عرضه می‌گردد.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

**راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:**

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دارو ساز خود مشورت نمایید:
- در صورت داشتن هرگونه ناراحتی سیستم اعصاب مرکزی، قلبی و عروقی، کلیوی، کبدی و سابقه حساسیت های پوستی بزرگ خود را مطلع نمایید.
- از مصرف این دارو در نواحی وسیعی از پوست یا مخاط و نیز از مصرف طولانی مدت به مقدار زیاد بدون دستور پزشک خودداری نمایید.
- در صورت عدم بهبودی یا تشدید بیماری. عفونت در موضع، بروز خارش و سایر علائمی که از قبل وجود نداشته است مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- هنگام استفاده از این دارو از استنشاق آن خودداری نمایید.
- محلول را در انتهای دهان یا گلو به کار نبرید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.
- تا یک ساعت بعد از مصرف این دارو از خوردن غذا خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اختلال در بلع و اسهال شود.
- قبل از استفاده از این دارو نیازی به خشک کردن محل مورد استفاده نیست.
- ناسازگاری بین این دارو و سایر داروها در مصرف همزمان دیده نشده با این حال توصیه می‌شود مصرف سایر داروها یک ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو باشد.
- در صورت بروز اختلالات شدید یا وسیع پوستی، آسیب مخاطی و همچنین در کودکان، سالخوردهگان و بیماران ناتوان با احتیاط مصرف شود.

**مصرف در بارداری و شیردهی:**

- از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری نمایید. اگرچه غلظت پایین دوز درمانی در شیر مادران شیرده دیده شده است اما هیچگونه عوارض جانبی پس از مصرف این دارو در نوزادان دیده نشده است.

**هشدارها:**

- از تماس این دارو با چشم و پوست هایی که دچار خراش و جراحت شده است خودداری نمایید.
- در صورت تماس دارو با چشم محل را سریعاً با آب سرد شستشو دهید.
- در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی به هنگام مصرف این دارو پزشک خود را مطلع نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**مقدار و نحوه مصرف:**

- قبل و بعد از هر بار مصرف، نازل اسپری را با آب گرم بشویید.
- محلول موضعی لیدوکائین به منظور بی حسی موضعی غشاهای موکوسی بکار

شرکت ایران دارو (سهامی عام)  
تهران - ایران

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان شهید کرمانی

نمابر: ۰۲۱-۶۶۶۲۵۸۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۲۸۸۵۲

کدپستی: ۱۳۷۱۶۵۸۱۱۱

E-mail: info@irandaru.com

Website: www.irandaru.com

صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۷۵۳