



ماینولا®
لیدوکائین ۲/۵ درصد و پریلوکائین ۲/۵ درصد

نام دارو: ماینولا® (لیدوکائین ۲/۵ درصد و پریلوکائین ۲/۵ درصد)

اشکال دارویی:

کرم موضعی. هر ۱۰۰ گرم کرم حاوی ۲/۵ گرم لیدوکائین و ۲/۵ گرم پریلوکائین. تیوب ۱۵ گرمی

دسته دارویی:

بی حس کننده موضعی

مقدار مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید.
- نکات مهم در مصرف این دارو بدین شرح میباشد:
 - ✓ قبل از استفاده، ناحیه موردنظر را با یک محلول ضد عفونی تمیز نمایید.
 - ✓ یک لایه ضخیم را بر روی ناحیه مورد نظر بگذارید و از پخش کردن آن خودداری نمایید. در ادامه، این ناحیه را (بجز ناحیه ژنییتال) با یک پارچه (باند) بپوشانید و محکم ببندید. از وجود لایه ضخیم در زیر پارچه مطمئن باشید و به پارچه آسیب نزنید.
 - ✓ بعد از ۱-۲ ساعت پارچه (باند) را برداشته و آن ناحیه را با یک محلول ضد عفونی کننده تمیز نمایید و طبق دستور پزشک درمان را ادامه دهید.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ترکیبات این دارو و یا دیگر بی حس کننده های موضعی (از نوع آمیدی).
- استعمال بر روی زخم های باز، سوختگی ها و یا نواحی شکسته و التهاب دیده
- نوزادان کمتر از یک ماه
- تماس با چشم، لب و دهان

موارد هشدار و احتیاط:

- این دارو فقط باتجویز پزشک مصرف شود.
- این دارو فقط جهت استعمال خارجی است. از تماس دارو با چشم، لب، دهان، زخم های باز، سوختگی و یا نواحی شکسته و التهاب دیده خودداری نمایید.
- در صورتی که ناحیه مورد نظر مبتلا به درماتیت آتوپیک، آگزما و بیماری های بافت همبند میباشد، با احتیاط مصرف نمایید.
- در افراد مسن بخصوص در بیماران، ناتوانان و کسانی که از دیگر بی حس کننده های موضعی استفاده می نمایند با احتیاط مصرف نمایید.
- استفاده از این دارو در ناحیه گوش توصیه نشده است.
- ریسک بروز مت هموگلوبینمی در کودکان زیر یک سال افزایش می یابد.
- در بیماریهای زیر با احتیاط مصرف نمایید:
 - ✓ نارسایی شدید کبدی و کلیوی
 - ✓ مت هموگلوبینمی
 - ✓ کمبود G6PD (گلوکز-۶- فسفات دهیدروژناز)
- بعد از مصرف این دارو دستهای خود را بشویید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- در صورت استفاده این دارو در کودکان، آنها را از نظر آسیب نرساندن به پارچه قرار گرفته در ناحیه مورد نظر و یا خوردن دارو تحت نظر داشته باشید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف، در تیوب را محکم ببندید.
- ممکن است مصرف این دارو، در صورت بر طرف نشدن بی حسی باعث بروز زخم هایی شود که قابل رویت نباشند؛ لذا ناحیه مورد نظر را نخاراندید، نمالید و در معرض دمای خیلی گرم یا سرد قرار ندهید تا بی حسی پایان یابد.

عوارض جانبی:

- واکنشهای آلرژیک مانند آنافیلاکسی، آنژیوادم، برونکواسپاسم، شوک، کهیر و اثرات سیستمیک از قبیل عوارض قلبی - عروقی، عوارض سیستم عصبی و مت هموگلوبینمی

- عارضه ای مهم که نیاز به مراقبت های پزشکی دارد ولی بندرت رخ میدهد : مت هموگلوبینمی
- عوارضی شایع که در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند : واکنشهای پوستی در ناحیه مورد نظر، انقباض عروقی / انقباض عروقی

تداخلات دارویی :

- بی حس کننده های سیستمیک و موضعی
- داروهایی که باعث القاء مت هموگلوبینمی میشوند : استامینوفن (در دوزهای بالا)، کلروکین، داپسون، ترکیبات حاوی نینترات یا نیتريت (نیتروفرانتوئین، نیتروگلیسرین و نیتروپروساید)، پارا آمینو سالیسیلیک اسید، فنوباربیتال، فنی توئین، سولفونامیدها (مافناید)

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایند.