

**Vitamin B1**  
300 mg



**ویتامین ب ۱**

۳۰۰ میلی گرم

**مشخصات دارو:**

۱۳ پلیستر ۰۵ عددی قرص در یک جعبه، هر قرص حاوی ۳۰۰ میلی گرم ویتامین ب۱ (تیماین هیدروکلراید)

**دسته دارویی:**

ویتامین محلول در آب

**موارد مصرف:**

کمبود ویتامین ب۱ (بیماری بری بری)

به عنوان مکمل در درمان سندرم ترک الکل

پیشگیری و درمان انسفالوپاتی ورنیکه (ناشی از کمبود ویتامین ب۱)

**راهنمایی های عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

در صورت داشتن هر نوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نمایید.

**موارد منع مصرف:**

این دارو در حالت های زیر به استثناء مواردی خاص که پزشک دستور می دهد، دارای منع مصرف می باشد:

حساسیت به این دارو یا فرآورده های حاوی این دارو و یا سایر ترکیبات این محصول.

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی با تجویز پزشک مجاز می باشد.

از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک در بارداری و شیردهی خودداری شود.

طبقه بندی دارو در بارداری: گروه A

**احتیاطات:**

در صورتی که بعد از چند روز از مصرف دارو هیچ بهبودی صورت نگرفت یا پزشک خود تماس بگیرید.

کمبود ویتامین ب۱ به تنهایی نادر است و معمولاً به همراه کمبود سایر ویتامین ها رخ می دهد.

در صورت بروز علائم حساسیتی نظیر (تورم صورت، لب ها، حنجره یا زبان، معده درد، سختی در تنفس یا یلغ، ضریان تند و درد قلبی) فوراً به پزشک مراجعه کنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

**تداخلات دارویی:**

مصرف همزمان با داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی ممکن است اثرات این داروها را افزایش دهد.

مصرف همزمان با نوشیدنی های حاوی الکل ممکن است جذب این دارو را کاهش دهد.

تیماین در محلول های قلبیایی یا خنثی ناپایدار است، لذا از مصرف محلول های قلبیایی (مانند کرینات ها، سیترات ها یا بیکربنات ها) به صورت همزمان خودداری

شود.

رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات بالا ممکن است نیاز بدن به ویتامین ب۱ را افزایش دهد.

**مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، لذا از مصرف بیش از مقدار تعیین شده توسط پزشک یا داروساز خودداری نمایید.

**بزرگسالان:**

درمان کمبود خفیف ویتامین ب۱: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه

درمان کمبود شدید ویتامین ب۱: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم

**کودکان** (نوزادان ۱ ماهه به بالا و افراد زیر ۱۸ سال):

درمان بیماری ادرار شربت آفر۵: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن

در مشکلات متابولیکی نظیر لاکتیک اسیدوز اکتفانی: ۱۰۰-۳۰۰ میلی گرم روزانه در ۲ یا ۳ دوز منقسم و در صورت نیاز تا ۲ گرم در روز

**مسمومیت:**

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**عوارض جانبی:**

هر دارو با وجود ایجاد اثرات درمانی ممکن است موجب بروز عوارض جانبی نیز بشود. ولی همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود.

احساس گرما، بیقراری، تعریق بیش از حد، خارش، کهیر، تهوع، خونریزی گوارشی، واکنشهای حساسیتی، ضعف، سیاتوز، ادم حنجره و ریه می باشد.

**شرایط نگهداری:**

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



شرکت ایران دارو (سهامی عام)  
تهران - ایران

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان شهید کرمانی  
کدپستی: ۱۳۷۱۶۵۸۱۱۱ | تلفن: ۰۲۱۶۶۶۲۸۸۴۸ | فاکس: ۰۲۱۶۶۶۹۲۵۸۶  
E-mail: info@irandaru.com Website: www.irandaru.com | ۱۳۱۸۵-۷۵۲ | صندوق پستی: