

## فولیکوئید® قرص روکش دار

### مشخصات فرآورده:

قرص روکش دار فولیکوئید® حاوی اسید فولیک ۵۰۰ میکروگرم و ید به شکل پتاسیم یداید ۱۵ میکروگرم، ۳ پلیستر ۱۰ عددی در هر جعبه.

### موارد مصرف فرآورده:

این محصول یک مکمل تغذیه ای بوده و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی باشد.

### راهنمایی های عمومی:

در صورت داشتن هر نوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نمایید.

قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

- حساسیت به این فرآورده
- مصرف سایر مکمل های تغذیه ای
- وجود آنژیوادم
- هموراژی پوستی / عضله ای
- آنمی پرئیشیوز
- بارداری و شیردهی

### موارد منع مصرف:

این فرآورده در حالات زیر به استثناء مواردی خاص که پزشک دستور می دهد، دارای منع مصرف می باشد:

- حساسیت به این فرآورده و یا سایر اجزای آن
- سایر داروها و مکمل های حاوی اسید فولیک و ید
- درمانیس هرپتی فرم
- بیماری های ندولار تیروئیدی همراه با بیماری های قلبی

Hypo Complementemic Vasculitis

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

برای مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

### احتیاطات:

مصرف طولانی مدت می تواند منجر به کاهش سطح سرمی ویتامین B<sub>12</sub> شود.

- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف این فرآورده همراه با سایر فرآورده هایی که حاوی اسید فولیک و ید هستند، خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی:

مصرف این فرآورده با داروهای زیر تداخل دارد:

آمینو اسید سالیسیلیک، داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های دی هیدروفولات ردوکتاز مانند متوترکسات و تری متوپریم، سولفاسالازین، هیدانتوئین ها، لیتیوم کربنات، داروهای ضد تشنج، آنتی اسیدها، آنتی بیوتیک ها، گلستیرامین، تریامتین، مکمل های حاوی زینک. در صورت استفاده از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع سازید.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف فرآورده:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است:

- روزی یک عدد همراه با غذا و یک لیوان آب

### مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### عوارض جانبی:

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:  
راش پوستی، تورم غدد بزاقی، یدیسم (طعم فلزی در دهان، سوزش دهان، گلو و زخم شدن لثه ها)، واکنش های آلرژیک، کاهش یا افزایش فعالیت غده تیروئید یا بزرگ شدن آن.  
عوارض نادر و یا با شیوع نامشخص:

علائم آلرژیک در مصرف خوراکی آن مشاهده شده، اختلال درد دستگاه گوارش.

### شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

