

**نام دارو:**

فلونوسینولون ۰/۰۲۵ درصد

اشکال دارویی:

پماد و کرم موضعی فلونوسینولون، هر ۱۰۰ گرم پماد و کرم موضعی حاوی ۰/۰۲۵ گرم فلونوسینولون استوناید. تیوب ۱۵ گرمی

دسته دارویی:

ضد التهاب استروئیدی

مقدار مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، لذا از مصرف بیش از مقدار تعیین شده خودداری نمایید.
- بصورت یک لایه نازک و با ملایمت روی موضع بمالید.
- چنانچه منطقه مورد نظر را قبل از استعمال دارو با آب یا صابون بشویید، ممکن است جذب دارو افزایش یابد.
- مصرف در کودکان توصیه نمی شود.
- از پوشاندن موضع با پانسمان و بانداز خودداری نمایید، مگر به تشخیص پزشک معالج.
- در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

از تماس دارو با چشم و اطراف آن، صورت، گشاله ران، زیر بغل و چین های پوستی خودداری نمایید. قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو.
- استفاده از این دارو بصورت منوترایی در عفونتهای اولیه باکتریایی.
- در صورت آلودگی حفره دهان به آفت یا تب خال.
- در صورت ابتلا به عفونت سلی نهفته و یا خاموش.
- در صورت ابتلا به آب مروارید، گلوکوم و دیابت شیرین.
- در صورت ابتلا به آکنه، روزاسه و آتروفی های پوستی.
- در صورت ابتلا به درماتیت تماسی و درماتیت اطراف دهان.
- در صورت ابتلا به پسوریازیس با پلاک های منتشر.

موارد هشدار و احتیاط:

- این دارو فقط جهت استعمال خارجی است.
- در صورت حاصل نشدن بهبودی پس از یک هفته از شروع درمان، با پزشک معالج تماس بگیرید (در صورت بروز التهاب موضعی، درمان را ادامه ندهید).
- در صورت استفاده همزمان این دارو با فرآورده های موضعی دیگر احتیاط نمایید.
- در صورت آلودگی موضع مصرف به عفونتهای قارچی، ویروسی و باکتریایی بایستی همزمان داروهای ضد عفونت مناسب نیز مصرف نمایید.
- در استفاده طولانی مدت و یا استعمال دارو در یک منطقه وسیع با پزشک معالج مشورت نمایید.
- دارو را بتدریج و تحت نظر پزشک معالج قطع نمایید.
- ارزیابی عملکرد آدرنال، در مصارف طولانی مدت توصیه می شود.
- در اثر مصرف داروهای استروئیدی موضعی، احتمال آتروفی (تحلیل رفتن) پوست وجود دارد.
- در مناطق رکتال و ژنیتال، بصورت طولانی مدت استفاده ننمایید.
- این دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- در کودکان و افراد مسن با احتیاط مصرف نمایید.
- پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

عوارض جانبی:

- عوارضی که با احتمال کم بروز کرده ولی نیاز به مراقبت های پزشکی دارند: درماتیت تماسی حساسیتی (خارش و حالت مشابه سوختگی)، قرمزی، عفونت پوستی، فولیکولیت (التهاب، قرمزی و دردناکی فولیکولهای مو در موضع مصرف دارو)، حساس شدن پوست موضع مصرف، ضخیم شدن و پوسته ریزی موضع، بروز لکه های قرمز تیره و زگیل مانند در پوست، کورک و احساس خارش در انگشتان.
- عوارضی که به مراقبت های پزشکی احتیاج ندارند: احساس سوزش.
- عوارضی که در صورت برطرف نشدن و ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند: خشکی، التهاب، خارش و قرمزی پوست.

تداخلات دارویی :-

مصرف در بارداری و شیردهی :
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :
در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید .