

## مشخصات محصول :

- ۳ پلیستر ۱۰ عددی به همراه بروشور در جعبه
- هر کیپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم عصاره ریشه گیاه پاناکس جینسنگ

## موارد مصرف :

- کمک به بهبود توان جنسی
- کمک به رفع ضعف بدن و عدم تمرکز

## راهنمایی های عمومی :

- در صورت داشتن هر نوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نمایید .

## موارد منع مصرف :

- این فرآورده در صورت حساسیت به ترکیبات گیاه جینسنگ و یا هریک از اجزاء فرمولاسیون دارای منع مصرف می باشد. مصرف این فرآورده در صورت ابتلا به بیماری فشار خون بالا توصیه نمی شود.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

- مصرف در دوران بارداری و شیر دهی مجاز نمی باشد .

## احتیاطات :

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .
- از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- در صورت وجود سابقه بیماری های قلبی عروقی و دیابت، بیماری های خود ایمنی، خونریزی ها، کنسرهای حساس به هورمون، بی خوابی، آسم، آگزما، پیوند اعضا و اسکیزوفرنی این فرآورده با احتیاط مصرف شود و قبل از مصرف با پزشک معالج مشورت گردد.
- به دلیل دارا بودن اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی ممکن است جینسنگ با درمان های ایمنوساپرسیو تداخل داشته باشد.
- در صورت مصرف فرآورده همراه با داروی دیگر، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- در صورت استفاده همزمان با داروهای کاهنده قند خون و انسولین و یا فرآورده های گیاهی و مکمل دارویی کاهنده قند خون با احتیاط مصرف شود.
- در مصرف همزمان فرآورده با داروهای زیر احتیاط لازم صورت گیرد:

- ترکیبات و داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی مانند کافئین، داروهای متابولیزه شونده با آنزیم CYP2D6، داروهای آنتاگونیست گیرنده استروژنی مانند تاموکسیفن، داروهای مدر .

- در صورت مصرف همزمان با ترکیبات و داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی مانند کافئین با احتیاط مصرف شود.
- از مصرف مقادیر بیش از حد فرآورده و به مدت طولانی (بیشتر از ۳ ماه) خودداری شود.
- مصرف این فرآورده در کودکان توصیه نمی شود.

## عوارض جانبی :

- رایج ترین عارضه مشاهده شده در مصرف فرآورده های حاوی جینسنگ، بی خوابی و بی قراری می باشد. سایر عوارض نادر به شرح زیر می باشد:
- درد پستان، خونریزی واژینال، تپش قلب، تغییرات فشار خون، کاهش قند خون، ادم، اسهال، سردرد و سرگیجه، عصبی بودن و خون دماغ

## تداخلات دارویی :

- از مصرف این فرآورده همزمان با داروهای زیر خودداری نمایید:
- فرآورده های گیاهی حاوی افسدرین (افدرا و ...)، فنلزین که یک مهارکننده MAO است، نیفدپین.
- از مصرف همزمان این فرآورده با دارو ها و یا فرآورده های گیاهی و مکمل دارویی دارای اثرات ضد انعقاد و رقیق کننده خون مانند وارفارین، NSAIDs و... خودداری شود.
- در صورت استفاده از داروهای خاص با پزشک معالج خود مشورت نمایید .

## نحوه صحیح مصرف :

- روزانه یک کیپسول همراه با غذا مصرف شود

## شرایط نگهداری :

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .

