

## لگزانول® استامینوفن ۵۰۰ / کافئین ۶۵ قرص خط دار

خوراکی مانند مشتقات یا اینداندیون، داروهای تحریک کننده مغزی، لیتوم، مهار کننده های منوآمین اکسیداز مانند فوئرازولیدون، پروکابایتین سزولین و ضد التهاب های غیر استروئیدی داخل دارد. مصرف این دارو می تواند در نتیجه برخی از تست های آزمایشگاهی تاثیر بگذارد لذا پزشک معالج را در جریان قرار دهید. استفاده همزمان این فرآورده با آدنوزین و دی پیریدامول می تواند در نتایج تست myocardial perfusion imaging تداخل ایجاد نماید.

این فرآورده در نتایج تست های قندخون، اسیداوریک، بیلی روبین و PT تاثیر می گذارد.

مصرف کافئین از طریق سایر داروها، غذاها و نوشیدنی ها را محدود نماید زیرا مصرف بیش از اندازه کافئین منجر به عصبی شدن، بی قراری تحریک پذیری، بی خوابی و افزایش ضربان قلب خواهد شد. در صورت استفاده از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع سازید.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو پزشک تعیین می نماید. طی ۲۴ ساعت بیش از ۸ قرص مصرف نشود.

### مسمومیت:

اسهال، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ و درد شدید شکم. در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

درمانیت حساسیتی، مشکلات کلیوی، مسمومیت کبدی، اگرانولوسیتوز و ترومبوسیتوپنی.

### شرایط نگهداری:

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نماید.

**مشخصات دارو:** هر قرص خط دار لگزانول، حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۶۵ میلی گرم کافئین. در بسته بندی ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در هر جعبه و ۳ پلیستر ۱۰ عددی در هر جعبه.

### دسته دارویی: ضد درد

موارد مصرف دارو: ضد درد و تب بر

### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

این دارو در اطفال زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود. در صورت داشتن هرنوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نماید.

### موارد منع مصرف:

قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید: در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به استامینوفن، کافئین، آسپرین و سایر داروهای مشابه.

در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و هیپاتیت ویروسی.

### مصرف در دوران شیردهی و بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد.

### احتیاطات:

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

مصرف همزمان سایر داروهای ضدالتهاب استروئیدی و سالیسیلات ها بیش از چند روز.

در صورت مصرف همزمان فرآورده های ترکیبی حاوی استامینوفن، آسپرین، کافئین و سایر داروهای مشابه.

مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن ممکن است منجر به آسیب کبدی شود.

### تداخلات دارویی:

این دارو با القاننده های کبدی، باربیتوراتها، پریمیدون، ضد انعقاد های



شرکت ایران دارو (سهامی عام)  
تهران - ایران

آدرس: ایران. تهران. بزرگراه آیت الله سعیدی. بلوار معلم. انتهای خیابان شهید کرمانی

تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۲۸۸۴۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۲۸۸۴۸

کدپستی: ۱۳۷۱۶۵۸۱۱۱

E-mail: info@irandaru.com

Website: www.irandaru.com

صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۷۵۳