



تریامسینولون ان ان تریامسینولون استوناید، نئومایسین ، نیستاتین

نام دارو:

تریامسینولون ان ان. (تریامسینولون استوناید، نئومایسین ، نیستاتین)

اشکال دارویی:

پماد موضعی تریامسینولون ان ان (هر صد گرم پماد حاوی ۱۰۰ میلی گرم تریامسینولون استوناید و ۲۵۰ میلی گرم نئومایسین و ۱۰ میلیون واحد بین المللی نیستاتین)

دسته دارویی:

ضد قارچ ، ضد باکتری، کورتیکواستروئید

موارد مصرف:

درمان کاندیدیاز پوستی و التهاب پوستی همراه با عفونت کاندیدیائی یا باکتریائی

مقدار مصرف:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
روزی ۱-۲ بار بصورت یک لایه نازک روی موضع بمالید .
- در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید. در صورتی که زمان مصرف نوبت بعدی رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ترکیبات این دارو.
- استفاده در نوزادان
- همزمان با فراورده های موضعی دیگر مانند فراورده های حاوی سالیسیلات و جنتامایسین .

موارد هشدار و احتیاط:

- این دارو را فقط باتجویز پزشک مصرف نمایید.
- از مصرف طولانی مدت این دارو یا مصرف آن روی نواحی وسیع از پوست بدن بخصوص در کودکان ، میانسالان و مبتلایان به نارسایی کلیوی خودداری نمایید .
- در صورت وجود دیگر ناراحتی های پوستی با پزشک مشورت نمایید .
- قبل از مصرف دارو، موضع باید با آب و صابون شسته و کاملاً خشک شود.
- از به کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه تحت درمان خودداری نمایید.
- این دارو فقط جهت استعمال خارجی است ، از تماس دارو با چشم ، بافت های مخاطی و پوست های صدمه دیده خودداری نمایید.
- ممکن است باعث ر نگی شدن لباس گردد .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف، درپوش تیوب را محکم ببندید.

عوارض جانبی:

واکنشهای افزایش حساسیتی مانند سوزش، خارش ،قرمزی، التهاب، بثورات ، نازک شدن پوست ،درماتیت تماسی ،اکنه، کم شدن رنگدانه های پوست

تداخلات دارویی :-

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری:

در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.