

لورادین® لوراتادین

مشخصات دارو:

این دارو به صورت شربت ۶۰ میلی لیتری حاوی ماده موثره لوراتادین به مقدار ۱mg در هر میلی لیتر می باشد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

از مصرف دارو در موارد زیر پرهیز نمایید و در صورت لزوم مصرف را با پزشک معالج مشورت نمایید.

- بارداری و شیردهی، نوزادان و اطفال، سالمندان
- در صورت مصرف همزمان با داروهای دیگر
- گلوکوم یا زاویه بسته، هیپرتروفی پروستات، احتیاس ادراری

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود و در صورت اجبار به مصرف آن باید میزان فواید و مضرات آن در نظر گرفته شود.

هشدارها:

- افرادی که نسبت به یکی از داروهای آنتی هیستامین حساسیت داشته باشند، ممکن است نسبت به سایر آنتی هیستامین ها نیز حساسیت نشان دهند.
 - در مورد اثرات این دارو بر جنین انسان مطالعات و بررسی های کافی انجام نشده است.
 - این دارو، برای مصرف هنگام شیردهی، در شیر ترشح می شود و لذا از مصرف دارو در دوران شیردهی خودداری شود.
 - این دارو، برای مصرف در نوزادان نارس توصیه نمی شود (افزایش احتمال عوارض آنتی کولینرژیک و تحریک یا تشنج).
 - مصرف آنتی هیستامین ها در سالمندان ممکن است موجب سرگیجه، خواب آلودگی، گیجی، توهم و افت فشارخون وضعیتی شود و یا ممکن است تاری دید، احتیاس ادراری، خشکی دهان دیده شود که در صورت تشدید این حالات، بیمار باید مصرف آنتی هیستامین را قطع نماید، اگر چه لوراتادین کمتر از سایر آنتی هیستامین ها موجب حالات فوق می گردد و عوارض آن هم وابسته به دوز است.
 - چنانچه اختلال عملکرد کلیسوی در بیمار وجود داشته باشد (بویزه سالمندان)، لوراتادین می تواند در اثر تجمع در بدن باعث بروز عوارض آنتی کولینرژیک با عوارض CNS گردد (حتی با دوز رایج و معمول بزرگسالان).
- مقدار و نحوه مصرف:**
- مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند ولی نکات مهم

در مورد مقدار و نحوه مصرف معمول لوراتادین به شرح زیر است:

در بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم یکبار در روز، در صورتیکه اختلال عملکرد کبدی یا افت عملکرد کلیسوی در بیمار دیده شود بطوریکه کلیترانس کراتینین کمتر از 30 ml/min باشد دوز اولیه باید ۱۰ میلی گرم یکروز در میان باشد.

در کودکان: برای اطفال ۶-۳ ساله، مقدار ۵ میلی گرم یکبار در روز و برای اطفال بالاتر از ۶ ساله همانند دوز بزرگسالان مصرف می گردد.
در سالمندان: مانند مقدار مصرف بزرگسالان استفاده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی اثرات و عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه غالب اوقات همه این اثرات ظاهر نمی شود اما در صورت بروز ممکن است نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشد. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر باید به پزشک اطلاع داده شود.
عوارضی که کمتر شایع هستند: آریتمی قلبی، تپش قلب، که با مقدار زیاد آنتی هیستامین ها و بندرت هم با لوراتادین بروز می کند.

عوارضی که شیوع بیشتری دارند: خواب آلودگی (با مقادیر بالاتر از مقدار معمول)، دیدن لکه های رنگی آبی، پریشانی، درد و سوزش به هنگام دفع ادرار، کسالت و خواب آلودگی، خشکی دهان، بیخی و گلو، تمبیر اشتها و وزن، افزایش تعریق، حساسیت به نور، احساس صدای زنگ و وزوز در گوش، بیثورات جلدی، نفخ، درد شکم، تهوع و ضریان سریع قلب.

مسمومیت: در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بیش از حد توصیه شده و بروز مسمومیت به علائم زیر، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

بی قراری و از دست دادن مهارت در فعالیت ها، خواب آلودگی شدید، خشکی دهان، بیخی و گلو، قرمزی و برافروختگی صورت، تنگی نفس یا کوتاهی نفس، ضریان قلب غیر عادی، توهم، تشنج، اختلال خواب و احساس ضعف و غش.

شرایط نگهداری: این دارو را دور از دسترس کودکان، دور از گرما و نور مستقیم و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد قرار داده و از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نماید.

بسته بندی:

شربت لوراتادین به رنگ زرد پرتقالی، در بطری کپری با نی با حجم ۶۰ میلی لیتری و با درپوش آلومینیومی بسته بندی و عرضه میشود.



شرکت ایران دارو - سهامی عام
تهران - ایران

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه ایت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان شهید کرمانی

تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۹۵۸۶

تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۲۸۸۵۲

کدپستی: ۱۳۷۱۶۵۸۱۱

E-mail: info@irandaru.com

Website: www.irandaru.com

سندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۷۵۳