



نام دارو:  
اتامبوتول

اشکال دارویی :  
قرص ۴۰۰ میلی گرمی

دسته دارویی :  
ضد باکتری (ضد سل)

موارد مصرف :

- همراه با داروهای ضد سل در درمان سل ریوی ناشی از باسیل سل
- درمان مننژیت سلی
- درمان عفونت های نامشخص میکو باکتری

مقدار مصرف :

- بزرگسالان : جهت درمان اولیه ۱۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم یک بار در روز مصرف می شود. در درمان مجدد ابتدا ۲۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم یکبار در روز به مدت ۶۰-۹۰ روز و سپس ۱۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم یکبار در روز مصرف می شود. در درمان مننژیت سلی یا عفونت نامشخص مایکو باکتریایی ۲۵-۱۵ میلی گرم برای هر کیلوگرم یک بار در روز تجویز می گردد.
- حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان در درمان اولیه تا ۱۵۰۰-۵۰۰ میلی گرم در روز و در درمان مجدد تا ۹۰۰-۲۵۰ میلی گرم در روز است.
- کودکان : در کودکان زیر ۱۳ سال مقدار مصرف دارو مشخص نشده است و در کودکان بالای ۱۳ سال مقدار مصرف همانند بزرگسالان است.

موارد منع مصرف :

این دارو در کودکان کم سن و در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک و دید ضعیف نباید مصرف گردد .

موارد هشدار و احتیاط :

- در صورت بروز تحریک گوارشی، می توان دارو را با غذا مصرف کرد.
- در صورت بروز تاری دید یا کاهش بینایی باید احتیاط کرد و بلافاصله به پزشک مراجعه نمود.

عوارض جانبی :

عوارض جانبی این دارو عمدتاً مربوط به اختلالات بینایی به صورت کاهش دقت بینایی، کوررنگی و محدود شدن میدان دید می باشد که با علایم نوریت اپتیک و کوررنگی قرمز - سبز بروزمی نماید.

تداخلات دارویی :

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .