شرکت ایران دارو (سهامی عام)
تهران – ایران

اسپری دهانی سالیوایِد
(بزاق مصنوعی)

مشخصات فرآورده:

بزاق مصنوعی به صورت اسپری دهانی می باشد. هر یک میلی لیتر، حاوی ۰/۳۵ گرم گلیسرین، به عنوان ماده موثره بوده و به صورت موضعی قابل استفاده است.

موارد مصرف:

این اسپری جهت درمان التهابات مخاط دهان ناشی از شیمی درمانی و پرتو درمانی، تحریک ترشح طبیعی بزاق، آبرسانی به حفره دهان، تسکین موقت ناراحتی های خفیف حفره دهانی و محافظت از نواحی تحریک شده در زخم های دهان و گلو استفاده می شود.

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

مانند همه داروها، این فرآورده نیز نباید در برخی شرایط استفاده شود. که عبارتند از:

- داشتن مشکل در حفره دهانی مثلا فقدان زخم خونریزی دهنده.
- درصورت حساسیت به هریک از اجزا تشکیل دهنده این فرآورده.

بارداری و شیردهی :

اگر باردار هستید، می خواهید باردار شوید و یا به کودک خود شیر می دهید، پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید و توصیه های لازم را دریافت کنید.

موارد هشدار و احتیاط:

درصورت استفاده از درمان های ضد قارچی که توسط پزشک تجویز شده است، مصرف آن ها را متوقف نکنید.

درصورت بروز عوارض جانبی و یا تشدید علائم بیماری در حین مصرف این فرآورده، مصرف این فرآورده را قطع کرده و به پزشک خود مراجعه کنید.

در صورت مصرف بیش از حد مجاز، فورا به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.

زخم شدید و مقاوم دهانی و زخم های دهانی همراه با تب، سردرد، تهوع و استفراغ حائز اهمیت هستند. لذا در این صورت حتما به پزشک مراجعه کنید.

در صورت عدم بهبود علائم زخم های دهانی طی دو روز پس از شروع مصـــــــرف یا ایجاد حساسیت، درد یا قرمزی مداوم و بدتر شدن علائم طی هفت روز پس از شروع درمان، مصرف فرآورده را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصـــرف می کنید، یا اخیرا داروی دیگری مصـــرف کرده اید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

تداخل دارویی پراهمیتی با این دارو وجود ندارد.

مقدار و نحوه مصرف:

بالغین و کودکان بالاتر از ۱۲ سال

در صورت نیاز ۲-۱ پاف در حفره دهانی اسپری کنید. حداکثر تا ۶۰ پاف در روز.

کودکان زیر ۱۲ سال

استفاده از این محصول می بایست تحت نظارت انجام شود.

کودکان زیر ۲ سال

پیش از استفاده از این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

نحوه مصرف

پیش از مصرف، هرگونه جسم خارجی را که در محل آسیب دیده وجود دارد، با شست و شو و یا با استفاده از یک گاز استریل خارج نمایید.

پیش از استفاده بطری را به خوبی تکان دهید.

در بطری را بردارید و نازل اسپری را روی بطری سوار کنید.

بطری را به صورت ایستاده نگه دارید، نازل را رو به محل آسیب دیده نگه داشته و آن را فشار دهید تا محلول روی موضع اسپری شود.

بعد از استفاده نازل را برداشته و در بطری را مجددا ببندید.

از شستن دهان پس از اسپری کردن فرآورده خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

مانند همه داروها، این دارو می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، هرچند که درهمه افـراد به طور یکسان بروز نمی یابند. عوارضی که ممکن است با مصرف این فرآورده بروز کند، عبارتند از:

اختلال در تکلم، اختلال هضم، اشکال در بلع، اختلالات گوارشی، مزه تلخ در دهان.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نورنگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

منبع:

BNF 84

آدرس: ایران. تهران. بزرگراه آیت الله سعیدی. بلوار معلم. انتهای خیابان شهید کرمانی

نمابر: ۰۲۱۶۶۶۹۲۵۸۶ **کدپستی:** ۱۳۷۱۶۵۸۱۱۱ **تلفن:** ۰۲۱۶۶۶۲۸۸۵۲

صندوق پستی: ۷۵۳-۱۳۱۸۵ **Website:** www.irandaru.com **E-mail:** info@irandaru.com