

زایلو ترا

کرم موضعی

### مشخصات دارو:

هر ۱۰۰ گرم کرم موضعی زایلو ترا حاوی ۷ گرم لیدوکائین به صورت هیدروکلراید و ۷ گرم تتراکائین به صورت هیدروکلراید می باشد.

### دسته دارویی:

بی حس کننده موضعی

### موارد مصرف دارو:

کاهش درد موقت، خارش و التهاب خفیف ناشی از حساسیت پوستی، سوختگی، گزش حشرات و سایر بیماری های مشابه.

### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

در صورت داشتن هر نوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نمایید.

قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و داروهای مشابه.

وجود عفونت در موضع مورد استفاده.

آسیب شدید موضع مورد استفاده.

خونریزی مقعدی و هموروئید در مصرف مقعدی دارو.

بارداری و شیردهی.

کودکان و سالمندان.

بیماری کبدی و نقص عملکرد شدید کلیوی.

### موارد منع مصرف:

این دارو در حالات زیر به استثناء مواردی خاص که پزشک دستور می دهد، دارای منع مصرف می باشد:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو و سایر اجزای آن.

استفاده در چشم..

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تحت نظر پزشک معالج مجاز می باشد.

## احتیاطات:

این دارو فقط جهت استعمال خارجی است.

مصرف در افراد حساس به سایر داروهای آن خانواده با احتیاط صورت گیرد.

در کودکان و افراد مسن با احتیاط مصرف شود.

از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود.

پس از هر بار مصرف در تیوب را محکم ببندید.

از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

## تداخلات دارویی:

در صورت استعمال مقادیر زیاد این دارو در بیماران مصرف کننده داروهای زیر احتمال تداخل وجود دارد:

داروهای ضد آریتمی همچون مگزیلتین

داروهای مسدود کننده گیرنده های بتا آدرنرژیک

سایمتیدین

## مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار و مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، لذا از مصرف بیش از مقدار تعیین شده خودداری نمایید.

بر روی محل آسیب دیده ۳ تا ۴ بار در روز به صورت یک لایه نازک روی موضع استعمال نمایید.

در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نموده و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید و درمان را مطابق با دستور پزشک معالج ادامه دهید.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

عوارض با شیوع کم: درماتیت تماسی آلرژیک (راش پوستی، قرمزی و خارش)، آنژیوادم (تورم پوست، دهان و گلو)، سوزش و گزگز که قبل از درمان وجود نداشته است، ورم و حساسیت به لمس.

عوارض با شیوع نادر: التهاب پیشابراه

**شرایط نگهداری:**

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دوازده سترس کودکان نگهداری شود.