



زباگر® ۵۰۲/۵ قرص روکش دار

مشخصات دارو:

هر قرص روکش دار زباگر حاوی ۲۵ میلی‌گرم بی‌پروپرولول فومارات ۳ بلیستر ۱ عددی.
هر قرص روکش دار زباگر حاوی ۵ میلی‌گرم بی‌پروپرولول فومارات ۳ بلیستر ۱۰ عددی.

موارد مصرف دارویی:

فشارخون بالا و درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب.

راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

در صورت داشتن هر نوع بیماری و مصرف دارو، پزشک خود را مطلع نمایید.

قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

● حساسیت به این دارو و سایر داروهای مسدود کننده آدرنژیک

● سالمندان

● بارداری و شیردهی

● اعمال جراحی

مصرف برخی داروهای مانند اسولین، داروهای کاهنده قند خون خوراکی، بلاک کننده های گیرنده کلسیمی، کلونیدین، مهارکننده های مونوآمینو اکسیداز، تیوفیلین، سمپاتومیتیک ها همچون سالمترول، داروهای مورد استفاده در ایمونوتراپی ال‌تری و عصاره های آلرژیک جهت تست پوستی.

در صورت وجود سایر بیماری ها و شرایط ویژه:

سابقه آریزی، آسم، آمفیوزم یا برونشیت غیر آلرژیک، نارسایی احتقانی قلب و یا واکنش آلرژیک خفیف همچون رینیت آلرژیک و راش پوستی، کم خونی، آسم، ادم، فشارخون بالا، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، نقص عملکردی کبدی و یا کلیوی، بزرگی تیروئیدی، بیماری ایسکمی قلبی، افسردگی یا سابقه ابتلا به آن، بیماری عروق محیطی، میاستنی گراویس، سپورایس، سندرم ریوند و فیکر و موسستوما، ضعف عضلانی، اسیدوز متابولیک.

موارد منع مصرف:

این دارو در حالات زیر به استثناء مواردی خاص که پزشک دستور می دهد، دارای منع مصرف می باشد:

● حساسیت مفرط به بی‌پروپرولول یا سایر داروهای مسدود کننده آدرنژیک.

● شوک قلبی، نارسایی قلبی کنترل نشده، بلوک درجه دو یا سه دهلیزی- بطنی، برادی کاردی سینوسی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تنها به تشخیص و تایید پزشک معالج مجاز می باشد.

احتیاطات:

● این دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید و از مصرف خودسرانه آن پرهیزید.

● در حین درمان با این دارو در فواصل منظم به پزشک معالج مراجعه نمایید تا روند بهبودی شما بررسی گردد.

● از قطع مصرف دارو بدون نظر پزشک معالج خودداری نمایید.

● بخاطر داشته باشید که این دارو فشارخون بالا را درمان نمی کند؛ بلکه آن را کنترل می کند. بنابراین ممکن است مصرف آن برای تمام عمر لازم باشد.

● به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و منگی، در هنگام رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط نمایید.

● مصرف این دارو در بیماران دیابتی ممکن است منجر به پوشاندن علامت کاهش قندخون و یا طولانی کردن کاهش قندخون و یا افزایش قندخون گردد.

● در صورت بدتر شدن نشانه های نارسایی قلبی از جمله تنگی نفس و افزایش وزن با پزشک معالج مشورت نمایید.

وزن یا پزشک معالج مشورت نمایید.

● دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

● از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

● مصرف این دارو با داروهای زیر تداخل دارد:

نمک های الومینوم و کلسیم، باربیتورات ها، کلسیرامین، کولستیرول، مهارکننده های کانال کلسیمی همچون نیفیدین و وراپامیل، ضد بارداری های خوراکی، ین سیلین ها (آمی سلین)، ریفاکسیم، دفن هیدرامین، فلکانتید، هیدروکسی کلروکین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، سالیسیلات ها، متوترکسات، کینیدین، سیپروفلوکساسین، کلونیدین، دیزوپیرامید، ارگوتامین، اپی نفرین، فینگو لیمود، اسولین، سولفونیل اوره ها، لیدوکائین، پرازوسین، سمپاتومیتیک ها همچون سالمترول، مهارکننده های مونوآمینو اکسیداز همچون سلازین، آمودارون، سایمتیدین، فنی توفین، فوتیازین ها، تیوفیلین، فرآورده های حاجب حاوی ید، داروهای مسدود عصبی- عضلانی، متی مازول، وارفارین، لوپ دیورتیک ها، در صورت استفاده از سایر دارو ها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

● مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، لذا از مصرف بیش از مقدار تعیین شده خودداری نمایید.

● در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مسمومیت:

● در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

● هر دارو به موزات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. گرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

● **عوارض با شیوع کم:** بزرگکاردی، افسردگی، برونکواسپاسم، سرگیجه، نارسایی قلبی، کاهش جریان خون محیطی

● **عوارض نادر و یا با شیوع نامشخص:** واکنشهای حساسیت همچون راش پوستی، آریتمی، کمردرد، درد مفاصل، درد قفسه سینه، گیجی، توهم، سمیت کبدی، افت فشارخون وضعیتی، لکوپنی، ترمبوسیتونی و ضایعات پوستی پسوریاتیک.

● در صورت ادامه یافتن و یا تشدید عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

● **عوارض شایع:** کاهش توانایی جنسی، اشکال در صحبت کردن، خواب آلودگی (بویژه در دوزهای بالا)، ضعف و خستگی غیر معمول.

● **عوارض با شیوع کم:** اضطراب، عصبانیت، بیوست، اسهال، احتقان بینی، تبوع و استفراغ، ناراحتی معده.

● **عوارض نادر و یا با شیوع نامشخص:** تغییر در حس چشایی، خشکی چشم، خارش پوست، کابوس.

● در صورت بروز عوارض زیر پس از قطع مصرف دارو با پزشک معالج مشورت نمایید:

● آریتمی، درد قفسه سینه، ضعف، سردرد، تنگی نفس، عطش و یخسه.

شرایط نگهداری:

● در دوز نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

منابع: Drug facts & comparison 2015, USPDI 2007



شرکت ایران دارو

آدرس: ایران تهران، بزرگراه آیت الله عینی، بلوار معلم، پهنای خیابان شهید کریمی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۲۵۲۰

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۲۵۲۳

کدپستی: ۱۳۹۵۵۱۱۱

E-mail: info@irandaru.com

Website: www.irandaru.com

سندپستی: ۱۳۴۵-۱۲۶