



نام دارو:

استازولامید

اشکال دارویی:

کپسول ۲۵۰ میلی گرم

دسته دارویی:

مهار کننده آنزیم کربنیک انهیدراز

موارد مصرف:

- درمان کمکی گلوکوم با زاویه باز (مزمن ساده)، گلوکوم ثانویه و برای کاهش فشار داخل چشم قبل از جراحی بعضی از انواع گلوکوم
- داروی کمکی در درمان صرع مقاوم به درمان نوع پتی مال، گرند مال و فوکل
- کاهش احتمال بروز و شدت علائم ناشی از بیماری حاد ارتفاع در کوهنوردان طی صعود سریع یا حتی آهسته

مقدار مصرف:

- بزرگسالان:
 - ✓ در گلوکوم با زاویه باز، ابتدا ۲۵۰ میلی گرم ۴-۱ بار در روز و به عنوان نگهدارنده براساس پاسخ بیمار مصرف می‌شود. در گلوکوم ثانویه و پیش از جراحی گلوکوم ۲۵۰ میلی گرم هر ۴ ساعت مصرف می‌شود.
 - ✓ به عنوان ضد تشنج، ۳۰-۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز در ۴ دوز منقسم مصرف می‌شود.
- کودکان: در درمان گلوکوم، ۳۰-۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز در چند دوز منقسم مصرف می‌شود.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به این دارو
- اختلال عملکرد کبدی و کلیوی
- نارسایی غده فوق کلیوی
- مبتلایان به گلوکوم زاویه بسته غیر احتقانی
- هایپو ناترمی
- هایپوکالمی

موارد هشدار و احتیاط:

- این دارو معمولاً برای مدت طولانی تجویز نمی‌شود در غیر این صورت شمارش عناصر خونی و کنترل غلظت الکترولیت‌های پلاسما باید انجام شود.
- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
 - نارسایی غده آدرنال (بیماری آدیسون)، اسیدوز هیپرکلرمیک، کاهش پتاسیم و سدیم خون، و اختلالات الکترولیتی، بیماری کبد، نارسایی کلیه و سنگ کلیه.
- این دارو ممکن است سبب خواب‌آلودگی، سرگیجه، منگی و خستگی شود لذا در رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، باید احتیاط شود.
- این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شد مصرف شود.
- در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- این دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید.
- در مبتلایان به اسیدوز تنفسی یا بیماریهای مزمن ریوی با احتیاط مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

پارستزی، هیپوکالمی، کاهش اشتها، خواب‌آلودگی و افسردگی، گهگاه بثورات جلدی، نزدیک بینی موقت، اختلالات خونی و سنگ‌های کلیوی

تداخلات دارویی:

- کینیدین
- فنی‌توئین
- کورتیکواستروئیدها
- گلیکوزیدهای قلبی
- سیکلوسپورین
- مقادیر زیاد آگونست گیرنده بتا دو مانند ریتودرین، سالبوتامول و تربوتالین

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .